



เพลี้ยแป้งในลำไย

รับมือป้องกันก่อนจะเพลี้ย

! จากผลการตรวจประเมินการจัดการศัตรูพืชในโรงคัดผลไม้ส่งออกไปประเทศจีน ปี 2565 ลำไยเป็นพืชที่ประเทศจีนมีการแจ้งเตือนตรวจสอบศัตรูพืชมาก เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้ควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง



มดเป็นพาหะพาเพลี้ยไปส่วนต่าง ๆ

เพลี้ยแป้งที่พบในลำไย 4 ชนิด



เพลี้ยแป้งสับประดสีเทา (เพลี้ยแป้งน้อยหนา)



เพลี้ยแป้งลาย



เพลี้ยแป้งกาแฟ



เพลี้ยแป้งแปซิฟิก (เพลี้ยแป้งสาวรส)

ลักษณะการทำลาย

เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ช่อดอก และผล ตั้งแต่แทงตาดอกจนถึงผลแก่ ทำให้เกิดอาการ

1. เหี่ยวแห้ง



2. มีราดำปกคลุม



การป้องกันกำจัด

กำจัดมด

ใช้ผ้าชุบน้ำมันเครื่อง หรือสารกำจัดแมลงพันไว้ที่โคนต้นและวัสดุค้ำยันต่าง ๆ



กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก

โดยเฉพาะหญ้าและหญ้าคา ถอนต้นและขุดเหง้าที่อยู่ในดินออก หรือใช้สารกำจัดวัชพืช



หากพบเพลี้ยแป้งเล็กน้อย

- ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก
 - ใช้น้ำฉีดพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป
 - ใช้ไวท์ออยล์ หรือปีโตรเลียม ออยล์
- อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเป็นจุดบริเวณที่พบ



พ่นสารกำจัดแมลง

- โทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 25 กรัม
 - ไดโนทีฟูเร็น 10% WP อัตรา 10 กรัม
 - มาลาโทออน 57% EC + ปีโตรเลียม ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร + 1 มิลลิลิตร
- โดยเลือกสารอย่างใดอย่างหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นสารอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

เรียบเรียง : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

จัดทำ : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

